



Folkhälsomyndigheten

خوب است در

مورد HPV بدانید

تطبیق واکسین این چنین صورت می گیرد

پرستار مکتب واکسین را در قسمت بالای بازو تزریق می کند. واکسین در دو مقدار (دوز) حد اقل در فاصله شش ماه میان هر (دوز) داده می شود. هرگاه کودک در هنگام گرفتن (دوز) اول ۱۵ سال یا بیشتر از آن عمر داشته باشد، در مجموع به سه (دوز) ضرورت می باشد.

قبل از تطبیق واکسین

اگر سوال ها یا نگرانی های دارید، قبل از تطبیق واکسین با پرستار مکتب صحبت کنید.

بعد از تطبیق واکسین

معمولاً بازو پس از سوزن زدن اندکی درد نموده، سرخ می شود، تورم می نماید و یا هم خارش می کند. ممکن است برخی افراد دچار تب کوتاه مدت، سردردی شده و در کل احساس مریضی نمایند. واکنش های حساسیتی (الرژیک) خیلی غیر معمول می باشد. اگر در مورد چگونگی وضعیت فرزندتان بعد از تطبیق واکسین نگران هستید، باید با پرستار مکتب یا مراقبت های صحی تماس بگیرید.

HPV (ویروس پاپیلوم انسانی) یک ویروس خیلی سرایت کننده است که می تواند در مراحل بعدی زندگی منجر به سرطان شود. تطبیق واکسین HPV از سرطان ناشی از ویروس محافظت می کند. این واکسین توسط پرستار مکتب به همه کودکان در صنف ۵ به شکل رایگان ارائه می گردد.

تطبیق واکسین بدون توجه به جنسیت، محافظت می کند

تطبیق واکسین HPV در برابر بیشتر انواع ویروس که می تواند باعث سرطان شود، محافظت می کند. به همه کودکان در مکتب تطبیق واکسین پیشنهاد می شود زیرا بهترین محافظت در آن زمان ایجاد می شود.

واکسین محافظت خوبی را ارائه می دهد

واکسین HPV در سراسر جهان برای محافظت در برابر سرطان انجام می شود. مطالعات نشان داده است که این واکسین محافظت خوبی را ارائه می دهد و بی خطر است. در سویدن همه واکسین های HPV در ژورنال ملی تطبیق واکسین، ثبت می گردد. به این ترتیب محافظت در برابر سرطان در دراز مدت قابل نظارت است.

آیا می خواهید بیشتر بدانید؟

اگر می خواهید قبل از تطبیق واکسین معلومات بیشتر بدست بیاورید با پرستار کودک تان تماس بگیرید.

HPV می تواند منجر به سرطان شود

انواع مختلفی از HPV وجود دارد. همه انواع آنها منجر به یک بیماری جدی نمی شوند، اما تعدادی از آنها می توانند باعث سرطان در آینده شوند. اکثر مردم در برخی مواقع به HPV آلوده می شوند، اما تعداد زیاد مردم این را نمی دانند زیرا این ویروس نه قابل دیدن است و نه هم احساس می شود.

HPV می تواند زمانی که غشاهای مخاطی یکدیگر را لمس می کنند، به عنوان مثال هنگام رابطه جنسی، پخش می شود. معمولاً این عفونت به خودی خود بهبود می یابد اما بعضاً طول میکشد. در آن هنگام خطر مبتلا شدن به سرطان حلق، دهانه رحم، اعضای جنسی (واژن، فرج یا آلت تناسلی مرد) یا مقعد در مراحل بعدی زندگی افزایش می یابد. همه ساله تقریباً ۱۵۵۰ نفر در سویدن به نوعی از سرطان ناشی از HPV مبتلا می شوند.

SKYDD
FÖR LIVET



برنامه واکسیناسیون سویدن

همه کودکان در سویدن از طریق تطبیق واکسین در برابر اکثریت امراض کشنده، محافظت دریافت می نمایند. تطبیق این واکسین ها از طریق BVC (مرکز مراقبت های صحتی از کودکان) و همچنان در مکتب صورت می گیرد.

زمانی که کودک

شش هفته عمر دارد اولین واکسین را دریافت می کند که در برابر عفونت (روتاویروس) محافظت می نماید.

سه ماهه عمر دارد دومین واکسین در برابر عفونت (روتاویروس) را دریافت می کند. در این زمان واکسین در برابر هفت مرض کشنده دیگر: دیفتیری، تیتانوس، سیاه سرفه، فلج کودکان، هموفیلوس انفلوانزا Hib، استرپتوکوک نومونیا و هیپاتیت B نیز داده می شود.

کودک پنج ماهه عمر دارد زمان آن فرا می رسد تا بار دیگر واکسین های را دریافت کند که او آنها را در سه ماهگی دریافت نموده بود.

وقتی کودک یک ساله شد برای بار سوم در برابر همان مریضی های واکسین می شود که در سه ماهگی و پنج ماهگی واکسین شده بود، به جز از واکسین در برابر عفونت (روتاویروس).

در یک و نیم سالگی واکسین

در برابر سرخکان، کله چَرک و [سرخچه داده می شود.

در پنج سالگی آخرین تطبیق واکسین در

BVC (مرکز مراقبت های صحتی برای کودکان) صورت می گیرد و این یک دوز تقویتی است در برابر دیفتیری، تیتانوس، سیاه سرفه و فلج اطفال.

زمانی که کودک تان

در صنف ۲ - ۱ است واکسین دوم در برابر سرخکان، کله چَرک و سرخچه داده می شود.


در صنف ۵ به همه کودکان دو واکسین در برابر ویروس پاپیلوم انسانی HPV به منظور جلوگیری از سرطان داده می شود.

در صنف های ۹ - ۸ آخرین واکسین در برابر دیفتیری، تیتانوس و سیاه سرفه داده می شود.

واکسین HPV بخشی از برنامه تطبیق واکسین سویدن می باشد.

در اینجا واکسین های را دیده می توانید که به منظور جلوگیری از مریضی های جدی به همه کودکان در سویدن ارائه می گردد. برای جلوگیری از بیماری های جدی

BVC (مرکز مراقبت های صحتی برای کودکان)



مکتب

