

Корисна інформація про

ВПЛ



Folkhälsomyndigheten

ВПЛ (вірус папіломи людини) — це дуже заразний вірус, який може призвести до раку в більш пізньому віці.

Вакцинація проти ВПЛ захищає від раку, викликаного цим вірусом. Всім дітям в 5 класі пропонується безкоштовна вакцинація у шкільної медсестри.

ВПЛ може призвести до раку

Існує багато різних типів ВПЛ. Не всі варіанти призводять до серйозного захворювання, але деякі з них можуть викликати рак пізніше в житті. Більшість людей заражаються ВПЛ в якийсь момент життя, але багато хто не знає про це через відсутність симптомів.

ВПЛ може поширюватися, коли слизові оболонки торкаються одна одної, наприклад, при статевих стосунках. Найчастіше інфекція проходить сама по собі, але іноді може бути затяжною. У такому разі збільшується ризик пізніше у житті захворіти на рак, наприклад, рак глотки, шийки матки, статевих органів (піхви, вульви або пенісу) або анального отвору.

Щороку близько 1550 людей у Швеції захворюють на якусь форму раку, викликаного ВПЛ.

Вакцинація захищає незалежно від статі

Вакцинація проти ВПЛ захищає від більшості варіантів вірусу, які можуть викликати рак. Усім дітям пропонується вакцинація в школі, оскільки у цьому разі створюється найкращий захист.

Щеплення забезпечує належний захист

Вакцинація проти ВПЛ проводиться у всьому світі для захисту від раку. Дослідження показали, що вакцина забезпечує хороший захист і є безпечною. У Швеції всі щеплення від ВПЛ реєструються в Національному реєстрі вакцинації. Таким чином, можна спостерігати за захистом від раку в довгостроковій перспективі.

Бажаєте дізнатися більше?

Якщо ви хочете дізнатися більше перед вакцинацією, будь ласка, зв'яжіться зі шкільною медсестрою вашої дитини.

ПРОЦЕС ВАКЦИНАЦІЇ

Шкільна медсестра вводить вакцину у вигляді ін'єкції в плече. Вакцина вводиться в двох дозах з інтервалом не менше півроку. Якщо при отриманні першої дози дитині виповнилося 15 років або більше, то потрібно три дози.

Перед вакцинацією

Якщо у вас є питання або побоювання з приводу вакцинації, зверніться до шкільної медсестри.

Після вакцинації

Після ін'єкції місце уколу на плечі може трохи боліти, почервоніти, набрякнути або свербіти. У деяких людей може спостерігатись короточасне підвищення температури, головний біль або загальне відчуття нездужання. Алергічні реакції зустрічаються дуже рідко. Якщо у вас є запитання або якщо ваша дитина почувається погано після вакцинації, зверніться до шкільної медсестри або медичного закладу.

**SKYDD
FÖR LIVET**



Шведська програма вакцинації

Всім дітям у Швеції пропонується захист від кількох серйозних захворювань через вакцинацію. Ці щеплення проводяться у дитячій поліклініці і в школі.

КОЛИ ВАШІЙ ДИТИНИ ВИПОВНЮЄТЬСЯ

- 🔹 **шість тижнів** — проводиться перша вакцинація для захисту від ротавірусної інфекції.
- 🔹 **три місяці** — проводиться друге щеплення від ротавірусної інфекції. Також проводиться вакцинація проти семи інших захворювань: дифтерії, правця, коклюшу, поліомієліту, палички Пфайфера, пневмокової хвороби і гепатиту В.
- 🔹 **п'ять місяців** — настав час повторити щеплення від семи захворювань, яке дитина отримала при останньому відвідуванні у віці трьох місяців.
- 🔹 **один рік** — дитина вакцинується втретє від тих же захворювань, що і в три та п'ять місяців.

🔹 **півтора року** — робиться щеплення від кору, паротиту і краснухи.

🔹 **п'ять років** — проводиться останнє щеплення у дитячій поліклініці, це бустерна доза проти дифтерії, правця, коклюшу і поліомієліту.

ЩЕПЛЕННЯ У ШКОЛІ:

- 🔹 **1-2 класи** — проводиться друге щеплення проти кору, паротиту і краснухи.
- 🔹 **5 клас** — всім дітям роблять два щеплення проти вірусу папіломи людини, ВПЛ, для профілактики раку.
- 🔹 **8-9 клас** — останнє щеплення від дифтерії, правця і коклюшу.

ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ ВПЛ Є ЧАСТИНОЮ ШВЕДСЬКОЇ ПРОГРАМИ ВАКЦИНАЦІЇ.

Нижче ви знайдете перелік щеплень, що пропонується всім дітям у Швеції для профілактики серйозних захворювань.

